



REDUKTOR®

Офталмологичен разтвор с флогистично действие

REDUKTOR® е офталмологичен разтвор с флогистично действие, който се използва като допълнително средство за защита и възстановяване на епитела на роговицата и конюнктивата. Продуктът е показан при възрастни и деца, за лечение на симптоми като: парене, сърбеж, фотофобия, усещане за чуждо тяло и зачервяване на окото, свързани с възпалителни състояния на очната повърхност и нейните придружаващи структури, като конюнктивит, кератит, блефарит, дакриоцистит, мейбомит, дискомфорт и синдром на сухото око.

REDUKTOR® може да се използва с контактни лещи.

ПОКАЗАНИЯ

REDUKTOR® е показан като помощно средство:

- при предоперативна профилактика
- при лечение на инфекции на конюнктивата
- при лечение на инфекции на роговицата
- при лечение на инфекции на придружаващите структури на окото (ръбове на клепачите, слъзни канали, мигли)
- при лечение на конюнктивит
- при лечение на кератит
- при лечение на дакриоцистит

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Отворете флакона и отстранете защитната капачка.
2. Внимателно стиснете флакона и накапете 1 или 2 капки.

Затворете флакона след употреба: разтворът може да се използва до 28 дни след първото отваряне.

Може да се използва с контактни лещи.

СЪСТАВ

Витамин E TPGS, двуосновен натриев фосфат, моноосновен натриев фосфат, натриев хлорид, хлорхексидин диглюконат, пречистена вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Продуктът е предназначен само за външна офталмологична употреба.
- Продуктът е предназначен за употреба от един пациент.
- Да не се използва в случаи на известна непоносимост или свръхчувствителност към някоя от съставките.
- По време на употреба, не докосвайте окото или която и да е друга повърхност с върха на флакона.
- Да не се използва в случай на нарушена или незатворена опаковка преди първоначалното отваряне.
- В случай на проблеми по време на употреба, прекратете лечението и се консултирайте с лекар.
- Има съобщения за много редки случаи на микрокалцификация на роговицата във връзка с употребата на фосфат-съдържащи офталмологични препарати при някои пациенти с предшествващи патологии на роговицата. В този случай се препоръчва използването на продукта под наблюдението на лекар.

- Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.
- Преди употреба прочетете внимателно инструкциите за употреба, които се намират в листовката.
- Да се пази далеч от деца.
- Да не се изхвърля в околната среда след употреба

Можете да съобщите за нежелани събития на производителя на имейл адрес: info@iromedgroup.com. Като докладвате нежелани събития, допринасяте за безопасността на този продукт. Всяко сериозно нежелано събитие трябва да бъде съобщено на производителя и на компетентния орган на страната, в която е използван този продукт.

СЪДЪРЖАНИЕ

Един многодозов флакон от 10 ml.

СЪХРАНЕНИЕ

Затворете флакона след употреба: останалият продукт може да се използва до 28 дни след първото отваряне.

СРОК НА ГОДНОСТ

При ненарушена цялост на опаковката: да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен върху кутията и флакона. Съхранявайте флакона във външната опаковка заедно с листовката, за правилната употреба по всяко време.


IROMEDGROUP S.r.l.

Via Tempio del Cielo 3/5 –
00144 Rome (Италия)


 Pharmaselect International
Beteiligungs GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20,
1020 Vienna, Австрия

Дистрибутори за България:

Фьоникс Фарма ЕООД,
ул. „Околовръстен път“ 199А
Стинг Ад, бул. „Асен Йорданов“ 6
Фармнет ЕАД, район Кремиковци,
м-ст „Япаджа“ 6

 0425 - МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ
съгласно Директива 93/42/ЕЕС със
съответните изменения.

 Да се пази далеч от деца

 Да не се изхвърля в околната среда след употреба

Ред.03 от 06/2021 г.